



# こどもの定期予防接種

種類		対象者	標準的な接種期間	接種方法及び回数
B型肝炎		生後1歳未満	生後2～9月に至るまで	初回：27日以上の間隔で2回接種 追加：1回目の接種から139日(20週)以上あけて、1回接種
ヒブワクチン		生後2～7月未満	標準的な接種開始時期： 生後2～7月に至るまで	初回：27日以上の間隔で3回接種 追加：初回3回終了後、7月以上後に1回接種
		生後7～12月未満	初回：27～56日の間隔で3回 追加：初回接種終了後7～13月	初回：27日以上の間隔で2回接種 追加：初回2回終了後、7月以上後に1回接種
		生後1～5歳未満	までの間隔をにおいて1回	1回接種
小児用肺炎球菌		生後2～7月未満	標準的な接種開始時期： 生後2～7月に至るまで	初回：27日以上の間隔で3回接種 追加：初回3回終了後、60日以上の間隔をにおいて、 生後12月以後に1回接種
		生後7～12月未満	初回：生後12か月までに27日以上の間隔をにおいて3回 追加：初回接種終了後60日以上	初回：27日以上の間隔で2回接種 追加：初回2回終了後、60日以上の間隔をにおいて、 生後12月以後に1回接種
		生後1～2歳未満	の間隔をにおいて生後12～	60日以上の間隔で2回接種
		生後2～5歳未満	15月に至るまで1回	1回接種
ロタウイルス	ロタリックス	生後6～24週まで	標準的な接種開始期間： 生後2月～14週6日後まで	27日以上の間隔で2回経口接種
	ロタテック	生後6～32週まで	※ ロタリックス及びロタテックのどちらかを経口接種	27日以上の間隔で3回経口接種
5種混合		生後2～90月未満	初回：生後2～7月に至るまで 20日～56日までの間隔を において3回 追加：初回接種終了後、6～18月 までの間隔をにおいて1回	初回：20日以上の間隔で3回接種 追加：初回接種終了後、6月以上の間隔をにおいて1回 接種
B C G		生後1歳未満	生後5～8月未満	1回接種
水痘		生後1～3歳未満	初回：生後12～15月未満 追加：初回終了後、6～12月の間 隔をおく	初回：1回接種 追加：初回終了後、3月以上の間隔をにおいて1回接種
麻しん風しん1期		生後1～2歳未満		1回接種
2期		小学校就学前の1年間 (年長児)		1回接種
日本脳炎 1期		生後6～90月未満	初回：生後3～4歳未満 6～28日の間隔で2回 追加：生後4～5歳未満 初回終了後おおむね1年 後に1回	初回：6日以上の間隔で2回接種 追加：初回2回終了後、6月以上の間隔で1回接種

## 妊婦を対象としたRSウイルスワクチン定期予防接種（2026年4月から開始）

- 対象者：妊娠28週から36週6日までの方
- 接種方法：妊娠ごとに1回（筋肉内接種）

RSウイルスワクチンを妊婦さんに接種することで、胎盤を通じて赤ちゃんへ免疫（抗体）を移行させ、生後6か月までの乳児のRSウイルス感染症の重症化を防ぎます。

