



子どもの定期予防接種

種類	対象者	標準的な接種期間	接種方法及び回数
B型肝炎	生後1歳未満	生後2～9月に至るまで	初回：27日以上の間隔で2回接種 追加：1回目の接種から139日(20週)以上あけて、1回接種
ヒブワクチン	生後2～7月未満	標準的な接種開始時期： 生後2～7月に至るまで	初回：27日以上の間隔で3回接種 追加：初回3回終了後、7月以上後に1回接種
	生後7～12月未満	初回：27～56日の間隔で3回 追加：初回接種終了後7～13月までの間隔をといて1回	初回：27日以上の間隔で2回接種 追加：初回2回終了後、7月以上後に1回接種
	生後1～5歳未満		1回接種
小児用肺炎球菌	生後2～7月未満	標準的な接種開始時期： 生後2～7月に至るまで	初回：27日以上の間隔で3回接種 追加：初回3回終了後、60日以上の間隔をといて、生後12月以後に1回接種
	生後7～12月未満	初回：生後12か月までに27日以上の間隔をといて3回 追加：初回接種終了後60日以上の間隔をといて生後12～15月に至るまで1回	初回：27日以上の間隔で2回接種 追加：初回2回終了後、60日以上の間隔をといて、生後12月以後に1回接種
	生後1～2歳未満		60日以上の間隔で2回接種
	生後2～5歳未満		1回接種
ロタウイルス	ロタリックス	生後6～24週まで	標準的接種開始期間： 生後2月～14週6日後まで
	ロタテック	生後6～32週まで	※ ロタリックス及びロタテックのどちらかを経口接種
5種混合 (R6.2.1以降の出生児が対象)	生後2～90月未満	初回：生後2～7月に至るまで 20日～56日の間隔をといて3回 追加：初回接種終了後、6～18月までの間隔をといて1回	初回：20日以上の間隔で3回接種 追加：初回接種終了後、6月以上の間隔をといて1回接種
4種混合	生後2～90月未満	初回：生後2～12月に達するまで 20～56日の間隔をといて 3回 追加：初回接種終了後、12～18月までの間隔をといて1回	初回：20日以上の間隔で3回接種 追加：初回接種終了後、6月以上あけて1回接種
B C G	生後1歳未満	生後5～8月未満	1回接種
水痘	生後1～3歳未満	初回：生後12～15月未満 追加：初回終了後、6～12月の間隔をおく	初回：1回接種 追加：初回終了後、3月以上の感覚をといて1回接種
麻しん風しん1期 2期	生後1～2歳未満		1回接種
	小学校就学前の1年間 (年長児)		1回接種
日本脳炎 1期	生後6～90月未満	初回：生後3～4歳未満 6～28日の間隔で2回 追加：生後4～5歳未満 初回終了後おおむね1年後に1回	初回：6日以上の間隔で2回接種 追加：初回2回終了後、6月以上の間隔で1回接種

- 予防接種は、福島県内の予防接種を実施している医療機関で受けてください。
- 予約が必要な場合もありますので、電話等で事前に確認してください。

