



# 子どもの定期予防接種

種類	対象者	標準的な接種期間	接種方法及び回数	
ヒブワクチン	生後2～7か月未満	生後2～7か月未満 (標準的な接種開始時期)	初回：27日以上(標準的には27～56日)の間隔で3回接種 追加：初回3回終了後、7～13か月後に1回接種	
	生後7～12か月未満		初回：27日以上(標準的には27～56日)の間隔で2回接種 追加：初回2回終了後、7～13か月後に1回接種	
	1歳～5歳未満		1回接種	
B型肝炎	1歳未満	生後2～9か月未満	1回目：生後2か月に1回接種 2回目：1回目の接種から27日以上あけて、1回接種 3回目：1回目の接種から139日以上あけて、1回接種	
ロタウイルス	ロタリックス	生後6～24週まで	標準的接種開始期間： 生後2月～14週6日後まで ※ ロタリックス及びロタテックのどちらかを経口接種	27日以上の間隔で2回経口接種
	ロタテック	生後6～32週まで		27日以上の間隔で3回経口接種
小児用肺炎球菌	生後2～7か月未満	生後2～7か月未満 (標準的な接種開始時期)	初回：27日以上の間隔で3回接種 (標準的には生後12月まで) 追加：初回3回終了後、60日以上あけて、1歳以後に1回接種 (標準的には1歳から1歳3か月の間に接種)	
	生後7～12か月未満		初回：27日以上の間隔で2回接種 (標準的には生後12月まで) 追加：初回2回終了後、60日以上あけて、1歳後に1回接種	
	1歳～2歳未満		60日以上の間隔で2回接種	
	2歳～5歳未満		1回接種	
四種混合	生後2～90か月未満	初回：生後2～12か月未満	初回：20～56日の間隔で3回接種 追加：初回3回終了後、12～18か月の間に1回接種	
B C G	1歳未満	生後5～8か月	1回接種	
水痘	1歳～3歳未満	初回：生後12～15か月	初回：1回接種 追加：初回終了後、6～12か月の間に1回接種	
麻しん風しん1期	1歳～2歳未満	1歳～2歳未満	1回接種	
	2期	小学校就学前の1年間 (年長児)	平成29年4月2日～ 平成30年4月1日生まれの人	1回接種
日本脳炎1期	生後6～90か月未満	初回：3歳～4歳未満 追加：4歳～5歳未満	初回：6～28日の間隔で2回接種 追加：初回2回終了後、おおむね1年後に1回接種	
	2期	9歳～13歳未満	9歳～10歳未満	1回接種
特例	平成15年4月2日生～平成19年4月1日 生まれの人	20歳の誕生日の前日まで受けられます。	日本脳炎予防接種を受けられなかった者3回接種 日本脳炎1期接種を完了した者1回接種	
二種混合	11歳～13歳未満	平成23年4月2日～平成24年4月1日 生まれの人	1回接種	

※ HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)については、ホームページ・広報紙にてご案内いたします。

